

Produits contre les ectoparasites chez le Chien (anti-ectoparasites) Benelux 2026

Principe actif	Administration*	Durée d'action	Âge minimal	Prescription	Puces			Phlébotome	Tiques	Agents de gale			Divers
					Adultes	Oeufs	Larves	Phlébotome	Tiques	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	
AVERMECTINES													
Sélamectine	SO	4 sem.	6 sem.	Avec									Poux broyeurs, ver cardiaque, ascaride
CARBAMATES & ORGANOPHOSPHORÉS													
Carbamates	Co, P, A, SO	2-4 mois	3 mois	Sans									Animaux non-allaitants, pas en Belgique
Organophosphorés	Co, P, A, SO	4-5 mois	3 mois	Sans									Animaux non-allaitants
CHLORONICOTINYL / NICOTINOÏDES													
Dinotéfurane / Pyriproxyfène / Perméthrine	SO	4 sem. puce / 3-4 sem. tique	7 sem./1,5 kg	Sans		8 sem.							Stomoxes et moustiques
Imidaclopride	SO	4 sem.	8 sem.	Sans									Poux broyeurs
Imidaclopride / Fluméthrine	Co	7-8 mois	7 sem.	Sans NL / Avec BE									Poux broyeurs
Imidaclopride / Moxidectine	SO	4 sem.	7 sem.	Avec									Poux broyeurs, Dirofilaria, Angiostrongylus, Crenosoma, Spirocerca, Eucoleus, Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Uncinaria, Trichuris
Imidaclopride / Perméthrine	SO	4 sem. puce / 3-4 sem. tique	7 sem./1,5 kg	Sans									Stomoxes, moustiques, poux broyeurs
Nitenpyrame	CP	1 jour	4 sem./1 kg	Sans									Pas en Belgique
PHÉNYLPYRAZOLÉS													
Fipronil	Spr	1-3 mois puce / 3-5 sem. tique	aucun	Sans									Poux broyeurs
Fipronil	SO	12 sem. puce / 4 sem. tique	8 sem./2kg	Sans									Poux broyeurs
Fipronil / Méthoprène	SO	8 sem. puce / 4 sem. tique	8 sem./2kg	Sans									Poux broyeurs
Fipronil / Perméthrine	SO	4 sem. puce / 4 sem. tique	8 sem./2kg	Avec NL / Sans BE									Moustiques
Fipronil / Pyriproxyfène	SO	7 sem. puce / 2-4 sem. tique	10 sem./2kg	Sans									12 sem. d'inhibition de la reproduction
Fipronil / Pyriproxyfène	Spr	3 mois puce / 4 sem. tique	2 jours	Sans									10 sem. d'inhibition de la reproduction
Pyriprole	SO	4 sem. puce / tique	8 sem./>2kg	Sans									

Ce tableau est une recommandation des médicaments potentiellement disponibles sur le marché. Pour des détails spécifiques concernant l'utilisation, les notices respectives doivent être consultées.

* A = Aérosol Co = Collier CP = Comprimé P = Poudre Sh = Shampoing Spr = Spray SO = Spot-On

Suite du tableau à la page suivante

© ESCCAP 2026

Principe actif	Administration*	Durée d'action	Âge minimal	Prescription	Puces			Phlébotome	Tiques	Agents de gale			Divers
					Adultes	Oeufs	Larves	Phlébotome	Tiques	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	
INHIBITEURS DE CROISSANCE D'INSECTES (ANALOGUES DE L'HORMONE DE CROISSANCE JUVÉNILE)													
Pyriproxyfène	SO	3 mois inhibition de croissance	4 sem.	Sans									Pas en Belgique
Pyriproxyfène / perméthrine	Env	6 mois inhibition de croissance	Ne s'applique pas	Sans									Autres arthropodes et insectes; pas en Belgique
ISOXAZOLINES													
Afoxolaner	CP	5 sem. puce / 1 mois tique	8 sem./2kg	Avec / Sans									
Afoxolaner / Milbémycine	CP	5 sem. puce / 1 mois tique	8 sem./2kg	Avec									Ver cardiaque, Angiostrongylus, Thelazia, nématodes intestinaux
Fluralaner	CP + SO	12 sem. puce / 8-12 sem. tique	8 sem./2kg	Avec									Prévient la ponte des œufs de puces. CP : Réduction du risque de dipylidiose et de babésiose par efficacité contre le vecteur respectif
Fluralaner	Inj	Jusqu'à 1 an puce / tique	6 mois	Avec									Prévient la ponte des œufs de puces. Réduction du risque de dipylidiose et de babésiose par efficacité contre le vecteur respectif
Fluralaner / Moxidectine / Pyrantel	CP	1 mois puce / tique	8 sem./1,27 kg	Avec									Prévient la ponte des œufs de puces. Réduction du risque de dipylidiose et de babésiose par efficacité contre le vecteur respectif
Lotilaner	CP	4 sem. puce / tique	8 sem./1,3 kg	Avec / Sans									
Lotilaner / Milbémycine	CP	4 sem. puce / tique	8 sem./1,4 kg	Avec									Nématodes intestinaux, ver cardiaque, Angiostrongylus
Sarolaner	CP	5 sem. puce / tique	8 sem./1,3 kg	Avec									
Sarolaner / Moxidectine / Pyrantel	CP	5 sem. puce / tique	8 sem./1,25 kg	Avec					4 sem. Dermacentor				
PYRÉTHRINES & PYRÉTHRINOÏDES													
Deltaméthrine	Co	5-6 mois	7 sem./1,5 kg	Sans									Moustiques
Perméthrine	Sh/P	2 - 4 sem.	3 mois	Sans									

Ce tableau est une recommandation des médicaments potentiellement disponibles sur le marché. Pour des détails spécifiques concernant l'utilisation, les notices respectives doivent être consultées.

* A = Aérosol Co = Collier CP = Comprimé Env. = spray pour l'Environnement Inj = Injection P = Poudre Sh = Shampoing Spr = Spray SO = Spot-On