


## Algemeen




- Als onderdeel van de jaarlijkse gezondheidscontrole dient de dierenarts de eigenaar minstens 1 keer per jaar te vragen naar en te adviseren over de parasietenbestrijding bij hun huisdieren.
- Goede handhygiëne moet worden gestimuleerd, vooral bij kinderen.
- Zandbakken afdekken als ze niet worden gebruikt.
- Groente en fruit dat rauw gegeten wordt moet grondig gewassen worden voor consumptie.
- Ontmoedig het voeren van rauw vlees aan hond en kat.
- Vers drinkwater dient altijd beschikbaar te zijn.
- Ontlasting van de hond dient tijdens het uitlaten direct opgeruimd te worden en in de tuin dagelijks. Deponeer honden- en kattenontlasting niet in de groenbak of op een composthoop. Was de handen na het opruimen van ontlasting.



## Inwendige parasieten (endoparasieten)

- Om individuele dieren gezond te houden en besmetting van de omgeving met *Toxocara*-eitjes te voorkomen, moeten pups en kittens elke 14 dagen behandeld worden tegen spoelwormen tot 14 dagen na het spenen. Start met ontwormen op 14 dagen leeftijd bij pups en op 21 dagen leeftijd bij kittens. Vergeet niet om het moederdier steeds gelijktijdig te behandelen.
- Volwassen katten en honden moeten gemiddeld 4 keer per jaar ontwormd worden om de uitscheiding van spoelwormeitjes (waaronder *Toxocara* spp.) te verminderen. Vaker, tot zelfs maandelijks, ontwormen is raadzaam in huishoudens met jonge kinderen of met personen met een minder goed werkend afweersysteem. Als alternatief kan regelmatig ontlastingsonderzoek worden uitgevoerd. Bij een positief resultaat moet het dier ontwormd worden.
- In gebieden die endemisch zijn voor *Echinococcus granulosus*, is het raadzaam om honden die slachtafval gevoederd krijgen, elke 6 weken te behandelen met praziquantel.
- In gebieden die endemisch zijn voor *Echinococcus multilocularis*, is het raadzaam om honden die jagen en kleine prooidieren opeten, maandelijks te behandelen met praziquantel.
- In gebieden die endemisch zijn voor *Dirofilaria* hartworm, is het raadzaam om katten, honden en fretten preventief, seizoensgebonden hiertegen te behandelen, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale epidemiologische situatie. Honden in endemische gebieden moeten jaarlijks getest worden op hartworm. Voordat preventief hartwormmedicatie wordt toegediend, dient er eerst getest te worden door een dierenarts.
- Een routinematige behandeling tegen wormen en longwormen hangt van meerdere factoren af: de lokale wetgeving, de dierenarts die rekening houdt met de epidemiologische omstandigheden, de perceptie van de eigenaar (zoals de behoefte aan een "nultolerantie" aanpak) en de individuele risicobeoordeling van het dier (jachthonden, blootstelling aan longworm in het verleden, rauwvleesvoeding, etc.). Overleg daarom altijd met uw dierenarts over een ontworming op maat voor uw dier.



## Uitwendige parasieten (ectoparasieten)

- Vlooiëninfestaties vormen het hele jaar door een risico voor huisdieren en blootstelling is moeilijk te vermijden. De beslissing om vlooiënbestrijdingsmiddelen te gebruiken moet gebaseerd zijn op een risicobeoordeling. Eigenaren moeten voorgelicht worden over het feit dat, wanneer zij geen routinematige profylaxe gebruiken en een vlooiëninfestatie plaatsvindt, het ten minste 3 maanden duurt voordat deze onder controle is. Profylactische behandelingen moeten gecombineerd worden met een omgevingsbehandeling.
- Tekenpreventie is raadzaam voor honden en katten die een groot risico lopen op tekeninfestatie. Dit risico is mogelijk groter tijdens het tekenseizoen, maar in sommige landen kan blootstelling het hele jaar aanwezig zijn.
- In gebieden waar canine *Leishmania* soorten endemisch zijn, is het raadzaam om honden maandelijks te behandelen met een afwerend middel tegen zandvliegen. Voor katten is het belangrijk om eerst het risico te beoordelen aan de hand van hun levensstijl alvorens een afwerend middel te gebruiken.