

Producten tegen ectoparasieten Hond (anti-ectoparasitica) Benelux 2026

| Werkzame stof | Toediening* | Werkingsduur | Min. lft | Kanalisisatie | Vlooien | | | Zandvlieg | Teken | Mijten | | | Diversen |
|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|---|
| | | | | | Volwassen | Eitjes | Larven | Zandvlieg | Teken | Otodectes | Sarcoptes | Demodex | |
| AVERMECTINEN | | | | | | | | | | | | | |
| Selamectine | SO | 4 wkn | 6 wkn | UDA | | | | | | | | | Bijtende luizen, hartworm, spoelworm |
| CARBAMATEN & ORGANOSFOSFATEN | | | | | | | | | | | | | |
| Carbamaten | B, P, A, SO | 2-4 mnd | 3 mnd | Vrij | | | | | | | | | Niet-zogende dieren, niet in België |
| Organofosfaten | B, P, A, SO | 4-5 mnd | 3 mnd | Vrij | | | | | | | | | Niet-zogende dieren |
| CHLORONICOTINYL / NICOTINOÏDEN | | | | | | | | | | | | | |
| Dinotefuran / Pyriproxyfen / Permethrin | SO | 4 wkn vlo / 3-4 wkn teek | 7 wkn/1,5 kg | Vrij | | 8 wkn | | | | | | | Stalvlieg en muggen |
| Imidacloprid | SO | 4 wkn | 8 wkn | Vrij | | | | | | | | | Bijtende luizen |
| Imidacloprid / Flumethrin | B | 7-8 mnd | 7 wkn | Vrij NL / UDA BE | | | | | | | | | Bijtende luizen |
| Imidacloprid / Moxidectine | SO | 4 wkn | 7 wkn | UDA | | | | | | | | | Bijtende luizen, Dirafilaria, Angiostrongylus, Crenosoma, Spirocerca, Eucoleus, Toxocara, Toxascaris, Ancylostoma, Uncinaria, Trichuris |
| Imidacloprid / Permethrin | SO | 4 wkn vlo / 3-4 wkn teek | 7 wkn/1,5 kg | Vrij | | | | | | | | | Stalvliegen, muggen, bijtende luizen |
| Nitenpyram | T | 1 dag | 4 wkn/1 kg | Vrij | | | | | | | | | Niet in België |
| FENYLPYRAZOLEN | | | | | | | | | | | | | |
| Fipronil | Spr | 1-3 mnd vlo / 3-5 wkn teek | geen | Vrij | | | | | | | | | Bijtende luizen |
| Fipronil | SO | 12 wkn vlo / 4 wkn teek | 8 wkn/2kg | Vrij | | | | | | | | | Bijtende luizen |
| Fipronil / Methopreen | SO | 8 wkn vlo / 4 wkn teek | 8 wkn/2kg | Vrij | | | | | | | | | Bijtende luizen |
| Fipronil / Permethrin | SO | 4 wkn vlo / 4 wkn teek | 8 wkn/2kg | UDANL / Vrij BE | | | | | | | | | Muggen |
| Fipronil / Pyriproxyfen | SO | 7 wkn vlo / 2-4 wkn teek | 10 wkn/2kg | Vrij | | | | | | | | | 12 wkn remming voortplanting |
| Fipronil / Pyriproxyfen | Spr | 3 mnd vlo / 4 wkn teek | 2 dgn | Vrij | | | | | | | | | 10 wkn remming voortplanting |
| Pyriprole | SO | 4 wkn vlo / teek | 8 wkn/>2kg | Vrij | | | | | | | | | |

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

* A = Aerosol B = Band P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

[Op de volgende pagina vervolg van de tabel](#)

| Werkzame stof | Toediening* | Werkingsduur | Min. lft | Kanalisisatie | Vlooien | | | Zandvlieg | Teken | Mijten | | | Diversen |
|--|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------|---|
| | | | | | Volwassen | Eitjes | Larven | Zandvlieg | Teken | Otodectes | Sarcoptes | Demodex | |
| INSECTEN GROEIREMMERS (CHITINE SYNTHESE REMMERS) | | | | | | | | | | | | | |
| Lufenuron | T | 4 wkn | gespeend | Vrij | | | | | | | | | Niet in België |
| INSECTEN GROEIREMMERS (JUVENIELE HORMOONANALOGEN) | | | | | | | | | | | | | |
| Pyriproxyfen | SO | 3 mnd groeiremming | 4 wkn | Vrij | | | | | | | | | Niet in België |
| Pyriproxyfen / permethrin | Omg | 6 mnd groeiremming | nvt | Vrij | | | | | | | | | Andere geleedpotige en insecten, Niet in België |
| ISOXAZOLINEN | | | | | | | | | | | | | |
| Afoxolaner | T | 5 wkn vlo / 1 mnd teek | 8 wkn/2kg | UDA / Vrij | | | | | | | | | |
| Afoxolaner / Milbemycine | T | 5 wkn vlo / 1 mnd teek | 8 wkn/2kg | UDA | | | | | | | | | Hartworm, Angiostrongylus, Thelazia, darmnematoden |
| Fluralaner | T+SO | 12 wkn vlo / 8-12 wkn teek | 8 wkn/2kg | UDA | | | | | | | | | Voorkomt dat vlooien eitjes leggen. T: Vermindering van het risico op Dipylidium- en Babesia-infectie door werkzaamheid tegen de respectievelijke vector |
| Fluralaner | Inj | 12 wkn vlo / 8-12 wkn teek | 6 maanden | UDA | | | | | | | | | Voorkomt dat vlooien eitjes leggen. Vermindering van het risico op Dipylidium- en Babesia-infectie door werkzaamheid tegen de respectievelijke vector |
| Fluralaner / Moxidectine / Pyrantel | T | 1 maand vlo / teek | 8 wkn/1,27 kg | UDA | | | | | | | | | Voorkomt dat vlooien eitjes leggen. T: Vermindering van het risico op Dipylidium- en Babesia-infectie door werkzaamheid tegen de respectievelijke vector |
| Lotilaner | T | 4 wkn vlo / teek | 8 wkn/1,3 kg | UDA / Vrij | | | | | | | | | |
| Lotilaner / Milbemycine | T | 4 wkn vlo / teek | 8 wkn/1,4 kg | UDA | | | | | | | | | Darmnematoden, hartworm, Angiostrongylus |
| Sarolaner | T | 5 wkn vlo / teek | 8 wkn/1,3 kg | UDA | | | | | | | | | |
| Sarolaner / Moxidectine / Pyrantel | T | 5 wkn vlo / teek | 8 wkn/1,25 kg | UDA | | | | | 4 wkn Dermacentor | | | | |
| PYRETHRINEN EN PYRETHROIDEN | | | | | | | | | | | | | |
| Deltamethrin | B | 5-6 mnd | 7 wkn/1,5 kg | Vrij | | | | | | | | | Muggen |
| Permethrin | Sh/P | 2 - 4 wkn | 3 mnd | Vrij | | | | | | | | | |
| Permethrin | SO | 4 wkn vlo / teek | 2 wkn | Vrij | | | | | | | | | Niet in België |

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

* A = Aerosol B = Band Inj = Injectie Omg = Omgevingspray P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet