

## Producten tegen ectoparasieten Kat (anti-ectoparasitica) Benelux 2026

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Kanalisisatie	Vlooien			Teken	Mijten	Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
<b>AVERMECTINEN</b>										
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn	UDA**						<i>Bijtende luizen, Dirofilaria, Toxocara, Ancylostoma</i>
<b>BISPYRAZOLEN</b>										
Tigolaner / emodepside / praziquantel	SO	13 wkn	10 wkn/1 kg	UDA						<i>Notoedres cati, darmnematoden, longwormen, lintwormen</i>
<b>CARBAMATEN &amp; ORGANOSFOSFATEN</b>										
Carbamaten	B, P, SO	2-4 mnd	3 mnd	Vrij						<i>Niet-zogende dieren, niet in België</i>
Organosfosfaten	B, P, SO	4-10 mnd	3 mnd	Vrij						<i>Niet-zogende dieren</i>
<b>CHLORONICOTINYL / NICOTINOÏDEN</b>										
Dinotefuran / Pyriproxyfen	SO	1 mnd	7 wkn/0,6 kg	Vrij		3 mnd	3 mnd			<i>Stalvlieg en muggen (alleen Nederland)</i>
Imidacloprid	SO	3-4 wkn	8 wkn	Vrij						
Imidacloprid / Flumethrin	B	vlooien 7-8 mnd teken 8 mnd	10 wkn	Vrij NL / UDA BE						
Imidacloprid / Moxidectine	SO	4 wkn	9 wkn	UDA						<i>Notoedres cati, Eucoleus aerophilus, darmnematoden, preventie hartworm, preventie en behandeling (L3/L4 larven) Aelurostrongylus abstrusus, Thelazia callipaeda</i>
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn/1 kg	Vrij						<i>Niet in België</i>
<b>FENYLPYRAZOLEN</b>										
Fipronil	Spr	1-3 mnd vlo 3- 5 mnd teek	geen	Vrij						<i>Bijtende luizen</i>
Fipronil	SO	4 wkn vlo / 4 wkn teek	8 wkn	Vrij						<i>Bijtende luizen</i>
Fipronil / Methopreen	SO	4 wkn vlo / 2 wkn teek	8 wkn/1 kg	Vrij						<i>Bijtende luizen, remming voortplanting vlo &gt; 6 wkn</i>
Fipronil / Methopreen / Eprinomectine / Praziquantel	SO	4 wkn vlo / 3 wkn teek	7 wkn/0,6 kg	UDA						<i>Bijtende luizen, Notoedres cati, darmnematoden, lintworm, hartworm, longworm, blaasworm, remming voortplanting vlo &gt; 1 mnd</i>
Fipronil / Pyriproxyfen	SO	5 wkn vlo / 1 week teek	10 wkn/1 kg	Vrij						<i>12 wkn remming voortplanting</i>

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

\* A = Aerosol B = Band P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

\*\* UDA = Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift

[Op de volgende pagina vervolg van de tabel](#)

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Kanalisatie	Vlooien			Teken	Mijten	Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
<b>INSECTEN GROEIREMMERS (JUVENIELE HORMOONANALOGEN)</b>										
Pyriproxyfen	SO	3 mnd groeiremming	4 wkn	Vrij						Niet in België
Pyriproxyfen / permethrin	Omg	6 mnd groeiremming	nvt	Vrij						Andere geleedpotige en insecten niet in België
<b>INSECTEN GROEIREMMERS (CHITINE SYNTHESE REMMERS)</b>										
Lufenuron	Inj	6 mnd	gespeend	UDA**						
<b>ISOXAZOLINEN</b>										
Esafoxolaner / Eprinomectine / Praziquantel	SO	4 wkn vlo / 5 wkn teek	8 wkn/0,8 kg	UDA						<i>Notoedres cati</i> , voorkomt dat vlooien eitjes leggen, div. gastro-intestinale, pulmonale en vesicale nematoden
Fluralaner	SO	12 wkn vlo / teek	9 wkn/1,2 kg	UDA						Voorkomt dat vlooien eitjes leggen
Fluralaner / Moxidectine	SO	12 wkn vlo / teek	9 wkn/1,2 kg	UDA						Voorkomt dat vlooien eitjes leggen, intestinale nematoden, 12 weken tegen larven van hart- en longworm
Lotilaner	T	4 wkn vlo / teek	8 wkn/0,5 kg	UDA						
Sarolaner / Selamectine	SO	5 wkn vlo / 4-5 wkn teek	8 wkn/1,25 kg	UDA						Bijtende luizen, spoelworm, haakworm, hartworm
<b>OXADIAZINEN</b>										
Indoxacarb	SO	4 wkn	8 wkn/0,6 kg	UDA						Niet in België
<b>SPINOSYNS</b>										
Spinosad	T	4 wkn	14 wkn/1,2 kg	UDA		reductie				

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

\* A = Aerosol B = Band Inj = Injectie Omg = Omgevingspray P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

\*\* UDA = Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift