

## Producten tegen ectoparasieten Kat (anti-ectoparasitica) Benelux 2021

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Kanalisisatie	Vlooiën			Teken	Mijten	Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
<b>AVERMECTINEN</b>										
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn	UDA						Bijtende luizen, div. endoparasieten
<b>CARBAMATEN &amp; ORGANOSFOSFATEN</b>										
Carbamaten	B, P, SO	2-4 mnd	3 mnd	Vrij						Niet-zogende dieren
Organofosfaten	B, P, SO	4-5 mnd	3 mnd	Vrij						Niet-zogende dieren
<b>CHLORONICOTINYL / NICOTINOÏDEN</b>										
Dinotefuran / Pyriproxyfen	SO	1 mnd	7 wkn/0,6 kg	Vrij		3 mnd	3 mnd			Stalvlieg en muggen (alleen NL)
Imidacloprid	SO	4 wkn	8 wkn	Vrij						
Imidacloprid / Flumethrin	B	7-8 mnd	10 wkn	Vrij NL / UDA BE						
Imidacloprid / Moxidectine	SO	4 wkn	9 wkn	UDA						Vlooiën , Notoedres cati, div. endoparasieten, hartworm bij fret
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn/1 kg	Vrij						Niet in België
<b>FENYLPYRAZOLEN</b>										
Fipronil	Spr	1-3 mnd vlo 3- 5 mnd teek	geen	Vrij						Bijtende luizen
Fipronil	SO	4 wkn vlo / 4 wkn teek	8 wkn	Vrij						Bijtende luizen
Fipronil / Methopreen	SO	4 wkn vlo / 2 wkn teek	8 wkn/1 kg	Vrij						Bijtende luizen, remming voortplanting vlo > 1 mnd
Fipronil / Methopreen / Eprinomectine / Praziquantel	SO	4 wkn vlo / 3 wkn teek	7 wkn/0,6 kg	UDA						Bijtende luizen, Notoedres cati, div. endoparasieten, remming voortplanting vlo 6 wkn
Fipronil / Pyriproxyfen	SO	5 wkn vlo / 1 week teek	10 wkn/1 kg	Vrij						12 wkn remming voortplanting

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

\* A = Aerosol B = Band P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Kanalisisatie	Vlooien			Teken	Mijten	Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
<b>INSECTEN GROEIEMMERS (JUVENIELE HORMOONANALOGEN)</b>										
Pyriproxyfen	SO	3 mnd groeiremming	4 wkn	Vrij						Niet in België
<b>INSECTEN GROEIEMMERS (CHITINE SYNTHESE REMMERS)</b>										
Lufenuron	Inj	6 mnd	gespeend	UDA						
<b>ISOXAZOLINEN</b>										
Fluralaner	SO	12 wkn vlo / teek	11 wkn/1,2 kg	UDA						Voorkomt dat vlooien eitjes leggen
Fluralaner / Moxidectine	SO	12 wkn vlo / teek	11 wkn/1,2 kg	UDA						Voorkomt dat vlooien eitjes leggen, div. endoparasieten
Lotilaner	T	4 wkn vlo / teek	8 wkn/0,5 kg	UDA						
Sarolaner / Selamectine	SO	5 wkn vlo / 4-5 wkn teek	8 wkn/1,25 kg	UDA						Bijtende luizen, div. endoparasieten
<b>OXADIAZINEN</b>										
Indoxacarb	SO	4 wkn	8 wkn/0,6 kg	UDA						
<b>SPYNOSYNS</b>										
Spinosad	T	4 wkn	14 wkn/1,2 kg	UDA		reductie				

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

\* A = Aerosol B = Band Inj = Injectie Omg = Omgevingspray P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet