

DIAGRAMME DE CHOIX DE VERMIFUGATION POUR LES CHIENS & CHATS ADULTES

Chien: ne sort pas ou sort mais n'a pas de contacts directs avec d'autres congénères, des parcs, des bacs à sable, des plaines de jeux, des escargots, de la viande crue ou des proies

Chat d'intérieur: La pression d'infestation des vers est faible.

Chien et/ou chat :
Sort et a des contacts directs avec des (excréments de) congénères, des parcs, des bacs à sable ou des plaines de jeux

Le chien vit dans une région endémique pour **l'échinococcose** (*Echinococcus multilocularis*), mange des proies et/ou va chasser sans surveillance

Mange des **proies** et/ou va **chasser** sans surveillance, a tendance à « tout » manger

NON

Mange des **escargots** et/ou de la **viande crue** et/ou a accès à de la **viande crue/des abats**

NON

OUI

OUI

Groupe à risque A

Groupe à risque B

Groupe à risque C

Groupe à risque D

GROUPES DE RISQUE

Groupe à risque A Traitez 1 à 2 fois par an contre les ascarides ou réalisez un examen des matières fécales^{1,2}

Groupe à risque B Traitez 4 fois par an contre les ascarides ou réalisez un examen des matières fécales^{1,2}

Groupe à risque C Traitez 4 à 12 fois par an contre les ascarides (chien & chat) et les cestodes (chien) sur base d'une analyse de risque^{1,2,3}

Groupe à risque D Traitez tous les mois contre les échinocoques ; 4 à 12 fois par an contre les ascarides sur base d'une analyse de risque^{1,2,3}

1) Si des segments de cestodes (proglottis) sont observés autour de l'anus ou dans les matières fécales, vermifugez contre les cestodes avec du praziquantel et commencez un traitement anti-puces

2) Éliminez immédiatement les matières fécales et jetez-les dans une poubelle à déchets ordinaires et non dans une poubelle à déchets verts

3) Analyse de risque réalisée par un vétérinaire

Recommandation: VERMIFUGEZ VOTRE CHIEN/CHAT _____ X PAR AN

CHIOTS

- À l'âge de 2 semaines, puis répéter toutes les 2 semaines jusqu'à 2 semaines après le sevrage. Ensuite tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois
- Toujours vermifuger les chiennes allaitantes contre les ascarides en même temps que les chiots

CHATONS

- Vermifuger dès l'âge de 3 semaines, puis répéter toutes les 2 semaines jusqu'à 2 semaines après le sevrage. Ensuite tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois
- Toujours vermifuger les chattes allaitantes contre les ascarides en même temps que les chatons