


Hoe bescherm ik mijn huisdieren tegen parasieten:

Belangrijke hygiëne maatregelen



Bespreek minstens elke 12 maanden met de dierenarts de parasietenbestrijding bij een huisdier als onderdeel van de jaarlijkse controle.




Dek zandbakken af als ze niet worden gebruikt.



Groente en fruit voor consumptie goed wassen.



Pas goede handhygiëne toe, vooral bij kinderen.




Voer geen rauw vlees. Vers drinkwater dient altijd beschikbaar te zijn.



Ruim de ontlasting van hond/kat direct op uit de tuin of tijdens het uitlaten en was hierna de handen. Ontlasting mag niet bij het groente-tuinafval of de composthoop gegooid worden.



Gezelschapsdieren beschermen tegen inwendige parasieten



Gezelschapsdieren beschermen tegen uitwendige parasieten

- Ter voorkoming van ziekte en om besmetting van de omgeving met *Toxocara*-eitjes te voorkomen, **behandel pups en kittens elke 14 dagen tegen speelwormen tot 14 dagen na het spenen**. Start met ontwormen op 14 dagen leeftijd bij pups en op 21 dagen leeftijd bij kittens. Behandel het moederdier steeds op dezelfde momenten mee tot twee weken na het spenen.
- **Ontworm volwassen katten en honden gemiddeld 4 keer per jaar ter vermindering van de speelwormei-uitscheiding** (waaronder *Toxocara* spp.). Vaker, tot zelfs maandelijks, ontwormen is raadzaam in huishoudens met jonge kinderen of met personen met een minder goed werkend afweersysteem. Als alternatief kan regelmatig ontlastingsonderzoek worden uitgevoerd. Bij een positief resultaat moet het dier ontwormd worden.
- Behandel in gebieden die endemisch zijn voor *Echinococcus granulosus* honden die slachtafval eten **elke 6 weken** met praziquantel.
- Behandel in gebieden die endemisch zijn voor *Echinococcus multilocularis* jagende honden en honden die kleine prooidieren eten **maandelijks** met praziquantel.
- In gebieden die endemisch zijn voor **hartworm** (*Dirofilaria immitis*), is het raadzaam katten, honden en fretten **preventief, seizoensgebonden te behandelen**. Houd hierbij rekening met de lokale epidemiologische situatie. Test honden in endemische gebieden jaarlijks op hartworminfecties. Preventieve hartwormmedicatie alleen toedienen indien er eerst door een dierenarts is getest.
- Een routinematige behandeling tegen wormen en longwormen hangt af van eventuele wetgeving, de dierenarts die rekening houdt met de epidemiologische omstandigheden, de perceptie van de eigenaar (zoals de behoefte aan een "nultolerantie" aanpak) en de individuele risicobeoordeling (jachthonden, historie van blootstelling aan longworm, rauw vleesvoeding, etc.). Overleg daarom met uw dierenarts over op maat ontwormen van een dier.

- **Vlooiëinfestaties** zijn het hele jaar door een risico voor huisdieren en blootstelling is moeilijk te vermijden. De beslissing om antivlooiënmiddelen te gebruiken moet gebaseerd zijn op een risicobeoordeling. Zonder routinematige vlooiënbestrijding duurt het ten minste 3 maanden voordat een vlooiënplag onder controle is. Vlooiënbestrijding moet gecombineerd worden met behandeling van de omgeving.
- **Tekenbestrijding** is nodig voor honden en katten die een risico lopen op tekeninfestatie. Dit risico is groter tijdens het tekenseizoen, maar in sommige landen kan blootstelling het hele jaar aanwezig zijn.
- In gebieden waar canine **Leishmania** endemisch is moeten honden behandeld worden met een afwerend middel tegen zandvliegen (frequentie volgens bijsluiting). Voor de kat kan de dierenarts eerst het risico beoordelen op basis van hun levensstijl, voordat een afwerend middel wordt gebruikt.

Bescherm de gezondheid van huisdieren en de mens voor een gezonde relatie mens en dier